

Nome do Medicamento:
ZIRVIT PLUS

Forma Farmacêutica:
**COMPRIMIDO
REVESTIDO**

Concentração:
**30 mg de Zinco; 1,00 mg
de Cobre; 100,00 mcg de
Selênio; 10000 UI de
Betacaroteno; 600,00 mg
de Ácido Ascórbico; 200
UI de Alfa-tocoferol**

BULA PARA O PACIENTE**ZIRVIT PLUS**
Zinco + ASSOCIAÇÃO**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES**

Comprimido Revestido: caixa com 8 e 30 comprimidos revestidos.

USO ORAL**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido contém:	IDR*
zinco	30,00 mg 428%
cobre	1,00 mg 111%
selênio	100,00 mcg 294%
betacatoreno	10.000 UI 500%
ácido ascórbico (Vitamina C)	600,00 mg 1333%
alfa-tocoferol (Vitamina E)	200 UI 1342%

Excipientes: dióxido de silício, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, talco, polissorbato 80, macrogol, dióxido de titânio, corante lacca alumínio vermelho nº 40, copolímero ácido metacrílico, simeticona, trietilcitrate, álcool isopropílico e água de osmose.

*IDR = Ingestão Diária Recomendada para Adultos segundo RDC nº 269/05.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado como suplemento vitamínico e mineral em dietas restritivas e inadequadas, em doenças crônicas / convalescença (para os casos que o paciente necessite de suplementação) e como antioxidante.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Zirvit Plus é um medicamento composto por algumas vitaminas e minerais, que atuam no organismo de forma a complementar as dietas restritivas e inadequadas e para pessoas que estão no período da convalescença (para os casos em que o paciente necessita de suplementação). Este medicamento atua também como antioxidante.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes com histórico de alergia a qualquer componente da formulação.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Devido à composição de vitaminas e minerais presente no Zirvit Plus, recomenda-se sua administração somente nos casos indicados.

Até o momento são desconhecidos casos de interações medicamentosas entre os componentes da fórmula de Zirvit Plus (zinco + ASSOCIAÇÃO) e outras substâncias.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamentos com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O medicamento é um comprimido de coloração vermelho escuro e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 1 (um) comprimido revestido ao dia, preferencialmente junto a uma refeição. Este medicamento deve ser ingerido junto com alimentos.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações desagradáveis decorrentes do uso deste medicamento, como fadiga, dor muscular, dor de cabeça, perda de pelos e sintomas neurológicos, foram provocadas somente com a administração de altas doses deste medicamento. Entretanto, tais sintomas desaparecem com a interrupção da medicação.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A ingestão de dosagens elevadas deste medicamento pode provocar efeitos irritantes no tubo digestivo pela presença dos oligoelementos. Caso alguém usar uma grande quantidade deste medicamento suspender o uso e procurar orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

M.S. nº 1.1861.0063

Farm. Resp.: Dra. Amanda Públio Lee CRF-SP nº 37.152

Registrado por: Ativus Farmacêutica Ltda

Rua: Emílio Mallet nº 317 – Sala 1005 – CEP: 03320-000 – Tatuapé-SP

CNPJ: 64.088.172/0001-41

Fabricado por: Ativus Farmacêutica Ltda

Rua: Fonte Mécia nº 2.050 – CEP: 13270-000 – Caixa Postal 489 – Valinhos-SP

CNPJ: 64.088.172/0003-03 – Indústria Brasileira

Comercializado por: Arese Pharma Distr. de Med. Ltda-ME.

Rua José Leal Fontoura, 332 – Sala 1 – Centro – CEP: 83414-190 – Colombo-PR

CNPJ: 14.812.380/0001-73 – SAC: 0800 770 79 70

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

